

Wat na de procedure?

Na de inspuiting moet u een uurtje rusten in de recovery of ontwaakzaal. U vult een evaluatieformulier in en bezorgt het aan het secretariaat van het pijncentrum.

Contact

Het multidisciplinair pijncentrum is bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer + 32 3 821 35 86.

Bij dringende gevallen buiten de kantooruren kunt u de wachtdienst van het pijncentrum contacteren via de telefooncentrale van het UZA +32 3 821 30 00.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Sacro-iliacale gewrichtsinfiltratie

Informatiebrochure patiënten

© UZA, maart 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Pijncentrum 201780



Kennis / Ervaring / Zorg




Beste patiënt

Welkom in het pijncentrum van het UZA. Binnenkort ondergaat u een ingreep. In deze brochure vindt u meer informatie ter voorbereiding. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Wat is sacro-iliacale gewrichtsinfiltratie?

Het sacro-iliacaal gewricht (SIG) is het gewricht tussen het heiligbeen en het darmbeen. Door ontsteking, natuurlijke slijtage, ongeval... kan pijn ontstaan. Deze pijn kan behandeld worden door inspuiting van plaatselijk verdovende middelen of ontstekingsremmers in en/of rond het gewricht.



Hoe verloopt de procedure?

U meldt zich aan op het secretariaat van het multidisciplinair pijncentrum. De verpleegkundige begeleidt u naar de behandelkamer. De zorgverleners vragen geregeld uw naam en geboortedatum en bepaalde medische gegevens (zoals allergie, diabetes, inname van antistollingsmedicatie, mogelijke zwangerschap).

Uw huid wordt steriel ontsmet. De ingreep wordt uitgevoerd als u op uw buik ligt, onder medische beeldvorming (radioscopie of echografie).

Wat zijn mogelijke neveneffecten?

Het is mogelijk dat u wat pijn ter hoogte van de prikplaats hebt. Zelden ervaart u tijdelijk krachtverlies in de onderste ledematen.

Hoe bereidt u zich best voor?

- Voor het onderzoek mag u drinken en eet u best een lichte maaltijd.
- Kies voor gemakkelijke, loszittende kledij.
- Draag geen juwelen.
- Laat waardevolle voorwerpen thuis.
- Zorg ervoor dat iemand u vervoert, want u mag zelf geen voertuig besturen na de verdoving.