

Wat na de procedure?

Na de inspuiting moet u een uurtje rusten in de recovery of ontwaakzaal. U vult een evaluatieformulier in en bezorgt het aan het secretariaat van het pijncentrum.

Contact

Het multidisciplinair pijncentrum is bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer + 32 3 821 35 86.

Bij dringende gevallen buiten de kantooruren kunt u de wachtdienst van het pijncentrum contacteren via de telefooncentrale van het UZA +32 3 821 30 00.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Zenuwinfiltratie onder echografie

Informatiebrochure patiënten

© UZA, februari 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Pijncentrum 201802



Kennis / Ervaring / Zorg




Beste patiënt

Welkom in het pijncentrum van het UZA. Binnenkort ondergaat u een zenuwinfiltratie onder echografie. In deze folder vindt u meer informatie ter voorbereiding. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Wat is zenuwinfiltratie?

Met een zenuwinfiltratie kan pijn vanuit een zenuw behandeld worden. Met behulp van echografie dient de arts een mengsel van plaatselijk verdovende middelen en ontstekingsremmers (corticoiden) toe met een naald rond de betreffende zenuw.



Hoe verloopt de procedure?

U meldt zich aan op het secretariaat van het multidisciplinair pijncentrum. De verpleegkundige begeleidt u naar de behandelkamer. De zorgverleners vragen geregeld uw naam en geboortedatum en bepaalde medische gegevens (zoals allergie, diabetes, inname van antistollingsmedicatie, mogelijke zwangerschap).

U gaat liggen op de rug, buik of zij of zitten, afhankelijk van de te verdoven zenuw. Uw huid wordt ontsmet. De echosonde wordt tegen de huid aangedrukt om de zenuw zichtbaar te maken. De arts spuit de medicatie in.

Wat zijn mogelijke neveneffecten?

Het is mogelijk dat u wat pijn ter hoogte van de prikplaats hebt. Soms kan u tijdelijk tintelingen voelen in het verdoofde gebied.

Voor het onderzoek mag u drinken en eet u best een lichte maaltijd. Kies voor gemakkelijke, loszittende kledij. Laat waardevolle voorwerpen thuis. Zorg ervoor dat iemand u vervoert, want u mag zelf geen voertuig besturen na de verdoving.