



Blaasspoelingen

Urologie

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Beste patiënt,

Welkom op de dienst urologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Deze brochure biedt extra informatie over blaasspoelingen als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Specifieke informatie die op uw situatie van toepassing is wordt u meegedeeld door uw uroloog. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie.



Inleiding

Er zijn in uw blaas poliepen vastgesteld, een oppervlakkige vorm van kanker. Deze zijn verwijderd door middel van een operatie via de plasbuis (TransUrethrale Resectie van de blaas of TUR-blaas). Bij meer dan 50% van de patiënten keren de poliepen echter terug, waarbij ze soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om ze alleen te verwijderen. Even belangrijk is te verhinderen dat ze terugkeren. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk om de kans dat deze poliepen terugkomen te verkleinen en de aantasting van de diepere spierlaag te verhinderen.

Blaasspoelingen kunnen met verschillende middelen uitgevoerd worden. Welk middel noodzakelijk is, wordt zorgvuldig door uw uroloog vastgesteld. Uw uroloog bepaalt van te voren hoeveel blaasspoelingen nodig zijn en binnen welke tijdspanne. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard van de poliep en wordt ook bepaald door het aantal keren dat u al eerder poliepen heeft gehad.

Vooraf kan uw uroloog u geen garantie bieden of de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zullen zijn.

Het verloop van de behandeling

De afspraken voor een reeks blaasspoelingen worden gemaakt bij de verpleegkundige op de raadpleging urologie.

Een blaasspoeling duurt ongeveer 1 uur en heeft plaats in ons daghospitaal op de raadpleging urologie. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. U mag voor de behandeling normaal eten. We raden u wel aan vooraf niet teveel te drinken. Nadien drinkt u best wel veel.


Voor elke nieuwe blaasspoeling wordt u gevraagd naar de mogelijke bijwerkingen die u ondervond (bloed plassen, irritatieklachten). Indien dit bij u het geval is, zal een urinestaal en eventueel een bloedname afgenoem worden voor onderzoek. Er wordt ook eventueel met antibiotica gestart. Na overleg met uw behandelende arts, kan dan de behandeling tijdelijk stopgezet worden.

Voor de behandeling wordt u gevraagd te plassen zodat uw blaas volledig leeg is. De verpleegkundige brengt een blaaskatheter (een dun slangetje) in de blaas in (zie figuur). Dit gebeurt liggend nadat u uw onderkledij uitgedaan hebt. Daarna wordt het medicijn via de katheter langzaam in de blaas ingespoten. Hierna wordt de katheter verwijderd. U moet nu proberen het medicijn tenminste 1 uur in de blaas te houden. Ondertussen wacht u liggend in onze behandelkamer in een bed en kunt u rustig iets lezen. Er wordt gevraagd elk kwartier te wisselen van houding (ruglig - zijlig links en rechts - buiklig).

Het medicijn wordt na voldoende inwerking uitgeplast, waarna de geslachtsdelen grondig gereinigd worden. Daarna mag u het ziekenhuis verlaten.

Nazorg

Vermijd huidcontact met de vloeistof. De eerste twee maal dat u geplast hebt, kunt u best de huid reinigen met water. Mannen kunnen het best zittend plassen. Spoel het toilet goed door. Bij morsen van urine buiten het toilet kunt u best de omgeving goed reinigen. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was. We raden u aan op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben. U moet voldoende drinken, minstens 1,5 l over de hele dag.



Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot irritatieklachten van de blaas, zoals frequente aandrang om te plassen, een pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, moeite met het ophouden van de urine, bloed of weefseldeeltjes bij de urine. Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen een dag na de spoeling verdwenen. Zo niet, dan kunnen de symptomen zonodig door uw uroloog bestreden worden met medicijnen.

Enkele soorten blaasspoelingen kunnen behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen teweegbrengen zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en een grieperig gevoel. Uw uroloog zal u hierover inlichten en tevens aangeven hoe u moet handelen bij dergelijke verschijnselen. Ook deze bijwerkingen zijn uitstekend te behandelen.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren zal uw uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie). Zijn er na één jaar geen poliepen teruggekomen, dan is de kans dat u poliepvrij blijft, toegenomen. Maar ook na jaren kunnen poliepen nog opnieuw verschijnen. Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken. Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan er overgeschakeld worden op een ander type spoeling.



Contact

Wenst u nog bijkomende informatie of heeft u vragen, dan kunt u steeds terecht bij de dienst urologie tel. 03 821 33 68.

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN



Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
+32 (0)3 821 30 00
+32 (0)3 829 05 20
info@uza.be
www.uza.be