

Wat verder thuis?

Als er tijdens het onderzoek een spoeling (bronchiale alveolaire lavage) is uitgevoerd, kan u mogelijk wat koorts krijgen. Als dit meer is dan 38.5°C, dan kan u een koortswerend middel met paracetamol nemen, bijvoorbeeld Dafalgan. De volgende dag moet de koorts verdwenen zijn.

Bij het hoesten kan er nog een beetje bloed in het slijm zitten. Dit komt door het onderzoek en zal de volgende dag over zijn. Bij grotere hoeveelheden bloed, bijvoorbeeld een zakdoekje vol, of bij aanhoudende koorts, moet u de raadpleging longziekten opbellen. De telefoonnummers vindt u achteraan.

Afspraak

Datum:

Uur:

Plaats: Raadpleging longziekten/pneumologie:
route 147

Aandachtspunten:

- Nuchter zijn (niets eten of drinken)
- Vervoer voorzien
- Plannen van een afspraak om de resultaten te bespreken

Contact

Raadpleging longziekten

03 821 46 74

Na de kantooruren kan u terecht op het algemene nummer van het ziekenhuis, tel. 03 821 30 00. De receptioniste verbindt u door met een bevoegde arts.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Bronchoscopie

Onderzoek van de luchtwegen

Informatiebrochure patiënten

© UZA, mei 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Pneumologie, 216900



Kennis / Ervaring / Zorg



Beste patiënt,

Welkom op de dienst pneumologie van het UZA. Binnenkort ondergaat u een bronchoscopie. Deze folder biedt wat meer informatie over dit **onderzoek** en de **voorbereiding** ervan.

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan de arts of verpleegkundige.

Wat is een bronchoscopie?

Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in uw luchtwegen met behulp van een bronchoscoop. Dit kijkinstrument is een dunne flexibele slang met een lens of een kleine video-camera. De bronchoscoop wordt via de mond of de neus tussen de stembanden naar de luchtwegen geleid. Het doel is om het slijmvlies te bekijken en zo nodig weefselstukjes te nemen voor verder onderzoek.

Hoe bereid ik mij voor?

- Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Heeft het onderzoek plaats in de voormiddag, dan mag u niet meer eten of drinken vanaf 24 uur op de avond voor het onderzoek. Uw medicijnen mag u 's ochtends wel innemen met een klein slokje water. Krijgt u het onderzoek na de middag, dan mag u 's ochtends vóór 7 uur ontbijten.

- Vertel het uw arts als u:
 - Bloedverdunnende medicatie gebruikt
 - Zwanger bent
 - Allergisch bent voor medicijnen, verdoving of latex
 - Suikerziekte heeft
- Neem uw medicatielijst mee.
- Draag geen nagellak of kunstnagels (dit hindert de zuurstofmeting).
- Zorg dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen. U mag gedurende 24 uur na het onderzoek geen voertuig besturen.
- Als u een kunstgebit draagt, dan wordt u gevraagd om dit in een aangeboden potje te leggen vóór het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een verstelbare onderzoeksstoel. Uw hartslag en zuurstofverzadiging worden voortdurend opgevolgd en u krijgt ook extra zuurstof toegediend via de neus.

Het onderzoek is niet pijnlijk. De mond, keelholte en/of de neus worden plaatselijk verdoofd met een spray om de braakreflex en de hoestprikkel te onderdrukken.

Na de verdoving van keel of neus plaatst de verpleegkundige een bijtring tussen de tanden zodat u niet op het toestel kan bijten. Vervolgens wordt de bronchoscoop via de mond of neus en de keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. U kan niet spreken tijdens het onderzoek, maar wel normaal ademen.

Het onderzoek zelf, zonder de voorbereiding van de keel, duurt ongeveer 15 à 30 min. U zal minstens een uur tot anderhalf uur in het ziekenhuis aanwezig zijn.

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts het slijmvlies van de luchtwegen en neemt hij of zij weefselstukjes indien nodig. Soms neemt de arts diepere stukjes longweefsel met een biopptang. Ook een longspoeling (lavage) is mogelijk. Daarbij brengt de arts wat vloeistof in een deel van de long via de bronchoscoop. De vloeistof wordt weer zoveel mogelijk teruggezogen en gaat voor verder onderzoek naar het laboratorium.

Een bronchoscopie-onderzoek lijkt op het eerste gezicht een vervelende ingreep, maar dank zij de huidige instrumenten en verdovingsmogelijkheden verloopt het onderzoek meestal zonder al te veel hinder.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek wordt u nog even opgevolgd tot u zich goed genoeg voelt om huiswaarts te keren.

U mag na het onderzoek 90 min niets drinken of eten. U kan zich namelijk verslikken zolang de verdoving in de keel niet is uitgewerkt. Na de wachttermijn start u met een slokje water. Als u goed kan slikken, mag u weer eten.