Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

Omdat we de bloedstalen niet kunnen afnemen langs het infuus waarlangs de tracer toegediend wordt, zal er naast het infuus voor de tracertoediening een tweede toegangsweg (katheter/infuus) aangebracht worden voor het nemen van de bloedstalen.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Contact

Dienst nucleaire geneeskunde
Tel.: 03 821 35 68
Fax: 03 825 33 08

© UZA, juni 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Nucleaire geneeskunde 2349826

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook en twitter

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Kennis / Ervaring / Zorg

EDTA-nierklaring

Informatiebrochure patiënten

Beste patiënt,

U ondergaat binnenkort een EDTA-nierklaring. Deze brochure geeft u wat meer informatie over het onderzoek en hoe u zich moet voorbereiden.

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. U vindt onze contactgegevens achteraan. We helpen u graag verder.

Het team nucleaire geneeskunde

Wat is een EDTA-nierklaring?

- Een EDTA-nierklaring is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof, ook wel tracer genoemd, de werking van de nier gemeten wordt.
- De tracer wordt ingespoten in het bloed en wordt nadien door de nieren uit het bloed verwijderd. Door het nemen van bloedstalen op vooraf bepaalde tijdstippen, kan de resterende hoeveelheid van deze tracer in het bloed bepaald worden.
- Doordat de nieren deze stof uit het bloed verwijderen, kunnen we de werking van de nieren (nierklaring) heel nauwkeurig bepalen.

Hoe bereidt u zich voor?

- U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
- U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen normaal innemen.
- Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Zeg ons op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
- Aangezien de tracer niet in de moedermelk terecht komt, dient u eventuele borstvoeding niet te onderbreken.
- Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten
- Bij kinderen tot en met 12 jaar wordt door de verwijzende arts een afspraak gemaakt op de afdeling kindergeneeskunde. Hier wordt een halfuur voor het onderzoek een infuusnaald ingebracht als voorbereiding op het onderzoek. Hierna gaat u naar de afdeling nucleaire geneeskunde.

Waar meldt u zich aan?

Komt u voor de eerste keer naar het UZA, ga dan naar het loket ‘Inschrijvingen raadpleging’ in de inkomhal. Nadien gaat u naar beneden (niveau -1) en volgt u route 11, nucleaire geneeskunde.

Als u al een patiëntenbadge van het UZA hebt, dan komt u rechtstreeks naar onze dienst (route 11).

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

- We dienen de tracer bij voorkeur via een ader van de arm toe. Deze katheter zal na toediening van de tracer verwijderd worden.
- Bloedstalen kunnen we niet afnemen langs het infuus waarlangs de tracer toegediend wordt. Daarom brengen we een tweede toegangsweg (katheter/infuus) aan voor het nemen van de bloedstalen.

Het onderzoek

- Op vooraf bepaalde tijdstippen worden er bloedstalen genomen. Het is heel belangrijk dat deze tijdstippen gerespecteerd worden.

Na het onderzoek

- U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
- U mag gewoon eten en drinken.
- Ook na het onderzoek is het belangrijk om extra te drinken.
- Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24u na toediening van de tracer (vb. samen televisie kijken met het kind op de schoot).